

Nuttige telefoonnummers

afsprakenbureau

- voor gynaecologen: 052 25 25 05

- voor de vroedvrouwen: 052 25 27 31

de gynaecologen

dr Peter Boelens

dr Katrien Laureys

dr Herman Nagels

dr Didier Oosterlynck

dr Leen Scharpé



De vruchtwaterpunctie

Waarom een vruchtwaterpunctie?

In het vruchtwater zijn cellen aanwezig die afkomstig zijn van de huid en de slijmvliezen van de foetus. Door onderzoek van deze cellen in een genetisch laboratorium, kan het chromosomaal patroon van de foetus in kaart worden gebracht. Hiermee kan bv. het Down Syndroom (mongolisme) worden vastgesteld.

Een vruchtwaterpunctie kan men echter ook uitvoeren om andere gegevens over de gezondheid van de foetus te verkrijgen, bv. in geval van toxoplasmose (de 'kattenziekte'), bij CMV-infectie, of bij bloedgroep-problemen.

Wat houdt het onderzoek in?

Een vruchtwaterpunctie is een ambulante onderzoek: een opname in het ziekenhuis is niet nodig. U hoeft niet nuchter te zijn, u hoeft geen volle blaas te hebben, en u kan direct weer naar huis.

-Uw gynaecoloog voert eerst een echografie uit waarbij vooral de ligging van de foetus en de placenta (moederkoek) worden bekeken.

-Aansluitend wordt onder echografisch zicht een dunne naald door de buikwand tot in het vruchtwater gebracht.

-Vervolgens wordt ongeveer 15 à 20 ml. vruchtwater opgezogen. Dit is ongeveer 1/10 van de totale hoeveelheid vruchtwater en dit wordt snel weer opnieuw aangemaakt.

De pijn die u ervaart is te vergelijken met de pijn van een prik voor een bloedafname. Indien u rhesus negatief van bloedgroep bent, krijgt u nadien een inspuiting om te voorkomen dat u antistoffen ontwikkelt tegen een eventueel rhesus positieve baby. Het is dus belangrijk uw bloedgroep te kennen.

De hele procedure duurt een 15 tal minuten, het feitelijke onderzoek slechts enkele minuten.

Wanneer gebeurt een vruchtwaterpunctie?

Een vruchtwaterpunctie kan gebeuren vanaf de 15^{de} zwangerschapsweek.

Wat is het risico verbonden aan een vruchtwaterpunctie?

Een vruchtwaterpunctie houdt een zeker risico in op miskraam (0,5% of 1 op 200).

Welke voorzorgsmaatregelen dien ik te nemen na een vruchtwaterpunctie?

In het algemeen wordt aangeraden om het de eerste 3 dagen na het onderzoek rustig aan te doen en druk op de buik te vermijden.

Dit betekent: geen zware lasten tillen, geen schokkende bewegingen maken (eventueel een hoestsiroop laten voorschrijven), geen sportinspanningen en geen seksueel contact.

Wanneer dien ik een arts te consulteren na het onderzoek?

Indien u vochtverlies, buikpijn, koorts of bloedverlies heeft, is het aangewezen uw gynaecoloog te verwittigen.

In geval van vochtverlies, wat een enkele keer voorkomt, is strikte bedrust aangeraden.

Lichte buikpijn ter hoogte van de prikplaats is normaal.

Wanneer verneem ik het resultaat?

Het volledige chromosoomonderzoek (karyotype) duurt 2 à 3 weken.

De snelle test (FISH) voor Down Syndroom (mongolisme) is echter na 3 à 4 dagen bekend.