

## Reisvaccins.

Als u op vakantie gaat, kan het raadzaam zijn om u tegen plaatselijke ziekten te laten vaccineren.

Dit geldt natuurlijk ook voor uw kinderen.

Afhankelijk van uw vakantiebestemming zal het om andere vaccins gaan.

Maak minstens 2 maanden voor uw vertrek een afspraak bij uw kinderarts om te bekijken welke vaccins voor u van toepassing zijn.

- *FSME (teken-encefalitis):*

Deze hersenontsteking kan worden overgebracht door teken in centraal Europa. Vaccinatie beschermt tegen deze ziekte.

Vooraleer u op reis vertrekt, worden 2 vaccins gegeven, en na 9 tot 12 maanden een 3de dosis. Het eerste vaccin wordt best 3 maanden vooraleer u vertrekt gegeven. Indien nodig, bij spoed, kan het ook uiterlijk 2 weken vooraf gegeven worden.

Om beschermd te blijven, is elke 3 jaar een herhalingsvaccin nodig.

Het vaccin kost ongeveer 40 euro per dosis.

## Neveneffecten van vaccins.

Vaccins kunnen spierpijn geven op de plaats waar ze worden gezet. Er kan ook roodheid komen rond de prikplaats. Kinderen kunnen soms laaggradige koorts krijgen en lastiger zijn. Hiervoor kan koortswering/pijnstilling worden toegediend.

Er gaan veel verhalen rond over andere neveneffecten, doch deze zijn niet waar. U kunt uw kinderarts hier altijd vragen over stellen.

## Nuttige informatie.

Secretariaat pediatrie: 052 25 20 08

Kinderartsen :

dr. I. Corthouts

dr. E. Devleeschouwer

dr. S. Lampmann

dr. B. Rutteman

dr. P. Verlinde

*Meer informatie over de kinderafdeling vindt u op onze website [www.azsintblasius.be](http://www.azsintblasius.be).*

*Klik door naar [zorgaanbod](#) → [verblijfsafdelingen](#) → [kinderafdeling](#).*



# Vaccinaties voor kinderen

## Waarom vaccineren?

Een vaccin stimuleert het afweersysteem om immuniteit op te bouwen tegen bepaalde ernstige infecties. Vaccins worden ontwikkeld tegen ziekten die ernstige gevolgen kunnen hebben.

Daarom staan wij als kinderartsen volledig achter het vaccineren van kinderen.

## Welke vaccins zijn er?

### *Basisvaccinaties:*

De Belgische overheid biedt het zogenaamde basisvaccinatieschema aan. Dit is het schema in het boekje van Kind en Gezin.

Deze vaccins worden door de overheid gratis ter beschikking gesteld.

### *Andere vaccins*

Naast het basisvaccinatieschema bestaan er nog vaccins. Deze vaccins worden niet door de overheid betaald\*.

Ze zijn even veilig en effectief als die van het basisvaccinatieschema.

*\*Veel mutualiteiten voorzien een bijdrage voor vaccins die niet gratis ter beschikking worden gesteld. Informeer hiernaar bij uw mutualiteit.*

## Inhalen?

Heeft uw kind één of meerdere vaccins niet gekregen volgens de gebruikelijke planning?

Dan kunt u samen met uw kinderarts een inhaalschema opstellen. Dit geldt zowel voor de vaccins van het basisvaccinatieschema als ook de extra vaccins die in deze folder vermeld staan. Het is nooit te laat om te vaccineren!

U kunt uw kind nog extra laten vaccineren tegen:

- *Varicella (windpokken):*

Meestal verlopen de windpokken zonder verwickelingen, maar in 5% van de gevallen doen die zich toch voor (hersenenontsteking, ernstige huidinfectie). In 2016 overleed in België zelfs nog een kind aan windpokken.

Het vaccin beschermt levenslang tegen het krijgen van windpokken en wellicht ook tegen het krijgen van zona (gordelroos).

Het vaccin kan worden gegeven vanaf de leeftijd van 1 jaar, met een tweede dosis na minstens 6 weken.

De prijs per dosis bedraagt ongeveer 50 euro.

- *Meningokok B:*

Naast de bekende meningokok C zijn er andere types van deze bacteriegroep die hersenvliesontsteking veroorzaken. Voor type B is er ook een vaccin beschikbaar. Jaarlijks overlijden 5 tot 10 kinderen in België aan meningokok B infectie. Er zijn ook 20 kinderen die ernstige en blijvende gevolgen ervan ondervinden.

Het vaccin kan worden gegeven vanaf de leeftijd van 3 maanden. Bespreek met uw kinderarts wanneer de vaccins best aan uw kind worden gegeven.

De prijs per dosis bedraagt ongeveer 85 euro.

- *Hepatitis A (leverontsteking):*

Dit virus veroorzaakt een ontsteking van de lever, met vaak geelzucht en jeuk gedurende 2 tot 4 weken. In 1% van de gevallen kan het verloop zeer ernstig zijn.

Het vaccin kan worden toegediend vanaf de leeftijd van 1 jaar, met een tweede dosis na 6 tot 12 maanden, en beschermt levenslang.

De prijs per dosis bedraagt ongeveer 30 euro.

- *Influenza (griep):*

Het griepvaccin is aangeraden voor chronisch zieken. Ook personen die in huis wonen bij baby's jonger dan 6 maanden en bij chronisch zieken, wordt aangeraden zich te laten vaccineren.

Omdat het griepvirus ieder jaar verandert, moet het vaccin jaarlijks worden toegediend, in de maanden oktober tot december.

Voor sommige mensen is er een terugbetaling (chronisch zieken), voor de anderen kost het vaccin ongeveer 12 euro.

- *HPV (humaan papilloma virus):*

Het basisvaccinatieschema voorziet dit vaccin voor meisjes, om baarmoederhalskanker te voorkomen. Bij jongens/mannen kan het virus orale en anale kankers, en genitale wratten veroorzaken, en bij seksueel contact kunnen jongens/mannen het virus doorgeven aan onvoldoende of niet gevaccineerde meisjes/vrouwen.

Het kan dus raadzaam zijn uw zoon te vaccineren. Dit kan vanaf de leeftijd van 10 jaar. Het vaccin wordt 2 maal gegeven, met een interval van 6 maanden.

Als uw zoon ouder is dan 15 jaar, is een derde dosis nodig. Het vaccin wordt best toegediend alvorens uw zoon seksueel actief wordt.

De prijs per dosis bedraagt ongeveer 130 euro.

Indien u één of meerdere van deze extra vaccins wenst te geven, bespreekt u dit met uw kinderarts.