

Tot slot

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundige of uw behandelende arts:

dr. E. Colpaert
dr. L. Krott
dr. M. Paelinck
dr. A. Pieters
dr. L. Triest

Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen op
de dienst gastro-enterologie

052 25 26 83 of 052 25 26 82

maandag tot en met vrijdag
tussen 8.00 en 17.00 uur.

Indien u verhinderd zou zijn op de dag van uw afspraak, verwittig ons dan zo snel mogelijk op één van bovenstaande nummers.



Maagonderzoek *(Gastroscoopie)*

lokale verdoving

ambulante patiënten

Afspraak op

datum:

uur:

Geachte mevrouw, mijnheer

Uw arts heeft voor u een maagonderzoek (gastroscoopie) aangevraagd.

Via een gastroscoop (= een flexibel buisje met bovenaan een videocamera) kijkt de arts naar de slokdarm en de maag.

Tijdens dit onderzoek controleert de arts uw maag en slokdarm op eventuele gezwellen, ontstekingen, poliepen en andere mogelijke afwijkingen. Indien nodig neemt de arts kleine stukjes weefsel weg voor verder onderzoek (=biopsie). Dit is volkomen pijnloos.

Het onderzoek gebeurt ambuland (u hoeft niet in het ziekenhuis te overnachten).

Vorbereiding thuis

Bespreek vooraf ook met uw arts of u BLOEDVERDUNNENDE MEDICATIE neemt: Marcoumar, Marevan, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Lixiana Sintrom, Plavix.

Voor het nemen van een biopsie tijdens de gastroscoopie is het nodig dat deze medicatie een aantal dagen voor het onderzoek gestopt wordt.

U moet de laatste 6 uren vóór het onderzoek nuchter blijven (= niet eten en niet drinken).

Aanmelden

U meldt zich aan via de kiosken op de 1ste verdieping en kiest voor 'raadpleging' bij de arts waarmee u een afspraak heeft.

Neem de inschrijvingsklevers die uit de kiosk komen.

Ga daarna naar de dienst gastro-enterologie: route 87 op de 2^{de} verdieping.

Neem plaats in de wachtzaal, de verpleegkundige komt u daar ophalen.

Verloop van het onderzoek

- De verpleegkundige gebruikt een spray om uw keel lokaal te verdoven.
- U gaat op de onderzoekstafel liggen op uw linker zij.
- De arts brengt de gastroscoop via de mond in de slokdarm. Hierbij wordt een mondstuk gebruikt. Dit dient om de gastroscoop te beschermen tegen beschadiging door de tanden.
- Het volledige onderzoek duurt 5 à 10 minuten.

Na het onderzoek mag u meteen weer naar huis. Met eten en drinken moet u wachten tot 1 uur na het onderzoek.

Resultaat van het onderzoek

De arts zal na het onderzoek de uitslag meedelen en een verslag opmaken voor de huisarts.

Risico's

Elke medische behandeling houdt steeds een bepaald risico in. Complicaties bij dit onderzoek zijn echter zeer uitzonderlijk.

Mogelijke verwikkelingen zijn:

perforatie van de maagwand, bloeding, hartritme-stoornissen en luchtweginfecties (na verslikken).

Complicaties kunnen in de hand gewerkt worden door uw medische of heelkundige achtergrond of door inname van bepaalde geneesmiddelen.

In uitzonderlijke gevallen is een opname in het ziekenhuis nodig.

Eventuele complicaties treden meestal op tijdens het onderzoek. Maar ook enkele dagen nadien kunnen volgende symptomen optreden: pijn in de buik of borstkas, braken van rood of zwart bloed, hoest, koorts, rillingen,...

Verwittig in dit geval zo snel mogelijk onze dienst of uw huisarts!