

Tot slot

Het is niet mogelijk in deze folder alle details voor elke situatie te beschrijven. Indien u bijkomende informatie wenst, aarzel dan niet om nadere uitleg te vragen aan uw NKO-arts.

Nuttige telefoonnummers

chirurgisch dagcentrum	052 25 22 00
spoedafdeling	052 25 25 25
afsprakenbureau	052 25 25 05

De neus- keel- en oorartsen

dr. Raf Jacobs
dr. Bart Van Boven
dr. Maaïke Cornelis



Verwijderen van amandelen bij volwassenen (tonsillectomie)

De amandelen (tonsillen) en hun functie

De (keel-)amandelen of tonsillen zitten links en rechts achteraan in de keel. Ze bestaan uit lymfeklierweefsel en zijn een onderdeel van het lymfekliersysteem. Dit vangt zoveel mogelijk binnen-dringende ziekteverwekkers op en maakt ze onschadelijk.

Toch heeft het verwijderen van amandelen geen merkbaar gevolg bij het bestrijden van infecties. De amandelen zijn immers maar een klein gedeelte van het totale lymfekliersysteem van het gehele lichaam.

Bovendien bevindt zich in de mond-keelholte ook lymfeklierweefsel in het slijmvlies van het weke verhemelte en in de zij- en achterwand van de keel zodat voldoende afweerfunctie overblijft.

Wanneer worden amandelen verwijderd?

De meest voorkomende redenen om amandelen te verwijderen :

- herhaaldelijk optredende acute ontstekingen van de amandelen (angina of acute tonsillitis)
- abcesvorming met ophoping van etter in het weefsel rond de amandel (peritonsillair abces)
- belemmering van de ademhaling door de grote omvang van de amandelen. Dit komt vooral 's nachts voor, in liggende houding.

De dag van de ingreep

Gezien de ingreep onder algemene verdoving gebeurt, dient u 's ochtends nuchter te zijn. Dit betekent dat u niet meer mag eten of drinken vanaf middernacht.

U wordt verwacht aan het onthaal van het chirurgisch dagcentrum op het afgesproken uur.

Na de inschrijving kan u zich zelf omkleden en stapt u het operatiekwartier binnen.

Hier wordt eerst een infuus aangebracht, waarna de anesthesist u in slaap brengt.

De amandelen worden verwijderd door ze stapsgewijze los te maken. Bloedvatjes die aanleiding geven tot bloeding, worden dichtgeschroeid.

Na de ingreep blijft u nog enige tijd (soms enkele uren) op de ontwaakkamer. Daarna gaat u naar het naverblijf tot u kan vertrekken (meestal rond 16u).

Medicatie

Na het verwijderen van de amandelen heeft u een tiental dagen keelpijn, vooral bij het slikken.

Vanuit het ziekenhuis krijgt u pijnstilling mee. Deze kan u starten volgens noodzaak van zodra u thuis bent, best met inname van voedsel.

U krijgt een aparte folder over pijnmedicatie mee naar huis.

Gebruik geen aspirine-bevattende geneesmiddelen (Aspirine, Aspro, ...) omdat aspirine een versterkte neiging tot bloeden veroorzaakt.

Nazorg

De eerste dagen na de ingreep dient u erop te letten zeker voldoende te drinken. De avond na de ingreep en de eerste dag na de ingreep kan u ook koud en zacht voedsel eten: ijsjes, yoghurt, pudding, Vanaf de tweede dag mag u zacht maar wat warmer voedsel eten. Vooral frieten en broodkorsten zijn de eerste week te mijden. Na een week kan u geleidelijk terug overschakelen op normale voeding.

De eerste weken na de ingreep is er een wit-geel beslag in de keel zichtbaar. Dit is een normaal verschijnsel en geen teken van infectie.

Daar u slechts één dag in het ziekenhuis blijft, raden we een controle door de huisarts aan één of twee dagen na de ingreep.

Hij zal nagaan of de pijn voldoende onder controle is en of de wondgenezing normaal verloopt.

Een controle bij uw NKO-arts (Neus- Keel- Oorarts) wordt voorzien na ongeveer een week.

Wat te doen bij koorts of bij bloeding na de ingreep?

Koorts na de ingreep is niet normaal. Daarom dient u in geval van koorts (>38°) de huisarts te raadplegen. Indien er na de ingreep rood bloed in de mond komt, is een controle door de NKO-arts aangewezen. Indien u geen NKO-arts kan bereiken, kan u zich via spoedgevallen aanmelden.

Werkonbekwaamheid

Tengevolge van de pijn en de sliklast is het meestal niet mogelijk de eerste tien tot veertien dagen na de ingreep te werken.