

Na het onderzoek

Net na het onderzoek kunt u lichte keelpijn, hoofdpijn, prikkelhoest en/of duizeligheid ervaren.

Wanneer u, eenmaal terug thuis, als gevolg van het onderzoek problemen ervaart of wanneer u extra vragen heeft, richt u zich best tot uw huisarts of de huisarts van wacht. Indien nodig zal hij/zij u doorverwijzen.

Resultaat

Het resultaat van het onderzoek krijgt u van uw arts dadelijk na het onderzoek.

Tot slot

Indien u verhinderd zou zijn op de dag van uw afspraak, gelieve ons dan zo snel mogelijk te verwittigen: 052 25 25 77.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00u en 17.00u.



Metacholine provocatietest

Informatiefiche

Afspraak op

(datum)

(uur)

Beste mevrouw, mijnheer

Uw arts heeft voor u een 'Metacholine provocatietest' aangevraagd.

Dit is een onderzoek om een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Metacholine, een prikkelende maar onschadelijke stof, waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten kan worden.

Vorbereiding thuis

- De dag van het onderzoek:
 - mag u niet roken
 - u mag wel ontbijten (u hoeft niet nuchter te zijn) maar u mag geen koffie, thee, cola en chocolade drinken of eten.
- Om de test goed te kunnen uitvoeren, moet u tijdelijk stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen:

medicatie die moet stopgezet worden:	minimum stoptijd vóór het onderzoek
Bretaris, Seebri, Spiriva, Incruse, Duaklir, Ultibro, Anoro, Spiolto	48 uur
Oxis, Foradil, Onbrez, Serevent, Symbicort, Seretide, Inuvair, Flutiform, Relvar, Bufomix, Cipla	24 uur
Oraal theophylline	12 tot 24 uur
Duovent, Atrovent	12 uur
Lomudal	8 uur
Ventolin	6 uur

Aanmelden

U schrijft zich in aan het onthaal (route 1, 1^{ste} verdieping).

Het onderzoek vindt plaats op route 35 op de dienst pneumologie (longziekten).

De verpleegkundige van de dienst komt u halen in de wachtzaal.

Verloop van de test

- Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint.
- Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. U krijgt een klem op de neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. U ademt via een mondstuk, dat is verbonden met een meetapparaat.
- Bij het begin van de test zal de verpleegkundige u vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. De longfunctie (spirometrie) wordt gemeten. Daarna moet u verschillende nevels met Metacholine inhaleren (inademen). Na iedere inhalatie wordt de longfunctie gemeten.
- Aan de hand van de meetresultaten kunnen we vaststellen of er astmatische klachten (hoesten en benauwdheid) kunnen worden opgewekt. Als deze klachten bij u optreden, dan geven we u luchtwegverwijdende medicijnen.

- De test wordt beëindigd als er een bepaalde reactie in de luchtwegen wordt opgewekt, of wanneer de maximale dosis van de Metacholine bereikt is. Uw longfunctie wordt nogmaals gecontroleerd vooraleer we de test volledig beëindigen.
- U kunt een lichte vorm van benauwdheid ervaren tijdens het onderzoek. Dit verdwijnt zodra u de luchtwegverwijdende medicijnen heeft ingeademd. Tijdens of na het onderzoek kunt u lichte keelpijn, hoofdpijn, prikkelhoest en/of duizeligheid ervaren.
- Het onderzoek kan belastend voor u zijn omdat u zo vaak krachtig moet ademen (blazen), maar het is niet gevaarlijk.
- Het totale onderzoek kan ongeveer een uur duren.