

Tot slot

Indien u verhinderd zou zijn op de dag van uw afspraak, gelieve ons dan zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00u en 16.00u:
052 25 26 60 (vragen naar nucleaire geneeskunde).



TRH-test (of TRF-test)

informatiefiche

Afspraak op
(datum)

(uur)

Wat is TRH

De TRH-test is een manier om de werking van de schildklier te controleren. TRH (ook wel TRF genoemd) is een hormoon dat in een bepaald gebied in de hersenen -de hypothalamus- wordt geproduceerd. Tijdens deze test krijgt u TRH toegediend, waardoor de hypofyse (= een klier in de hersenen) aangezet wordt tot het afgeven van TSH. TSH stimuleert op zijn beurt de schildklier om schildklierhormonen aan te maken.

Een gestoorde functie van de hypofyse kan dus stoornissen geven in de werking van de schildklier.

Vorbereiding thuis

U hoeft zicht niet speciaal voor te bereiden. U mag vooraf alles eten en drinken. Wel is het aan te raden om vooraf geen koffie of thee te drinken (kan misselijkheid veroorzaken tijdens de test).

Aanmelden

U schrijft zich in aan het onthaal (1^{ste} verdieping, route 1). Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de dienst nucleaire geneeskunde (eveneens op de 1^{ste} verdieping, route 55).

Verloop van de test

- Stap 1:
Er wordt een infuusnaaldje geplaatst, zodat u maar één keer geprikt hoeft te worden. Langs deze weg wordt door een verpleegkundige op de dienst bloedafname eerst bloed afgenomen en vervolgens TRH toegediend.
- Stap 2:
20 minuten later wordt opnieuw bloed afgenomen.
- Stap 3:
U gaat terug naar de dienst nucleaire geneeskunde.
-Via het infuus krijgt u daar een radioactief product toegediend om de schildklier zichtbaar te maken.
-Deze vloeistof moet 20 minuten inwerken
-Daarna wordt een scan gemaakt.
- Stap 4:
tenslotte wordt opnieuw bloed afgenomen (60 minuten na aanvang van de test).

In het bloed kan de door de hypofyse geproduceerde hoeveelheid TSH gemeten worden.

Gelieve er rekening mee te houden, dat de test en bespreking van het resultaat samen makkelijk een hele voormiddag in beslag kunnen nemen.

Bijwerking

Mogelijke bijwerkingen (meestal van korte duur) zijn:
-misselijkheid
-een rare smaak in de mond.

Wanneer u, eenmaal terug thuis, als gevolg van het onderzoek problemen ervaart of wanneer u extra vragen heeft, richt u zich best tot uw huisarts of de huisarts van wacht. Indien deze het nodig acht, zal hij/zij u eventueel doorverwijzen.

Resultaat

Het resultaat krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd.

OPGEPAST!

U mag deze test niet ondergaan:

- indien u zwanger bent (of zwanger zou kunnen zijn)
- wanneer u borstvoeding geeft