

## Praktische informatie

Na inschrijving aan de kiosken (route 1 aan het onthaal) wordt u verwacht in de wachtzaal op route 11 op het afgesproken uur.

Het is noodzakelijk dat u zich laat vergezellen door een tweede persoon (een familielid, partner, vriend of vriendin, ...) die zorgt voor het vervoer naar huis. U mag na de behandeling immers niet zelf met de wagen rijden.

Na de ingreep wordt u een afspraak voor de eerste controle meegegeven en kan u het ziekenhuis verlaten.

U zal de nodige medicatie meekrijgen.  
Heffen, bukken, hoesten en niezen dient u te vermijden.

## Nuttige telefoonnummers

Oogheelkundig assistent	052 25 29 07
Spoedafdeling	052 25 25 25
Afsprakenbureau	052 25 25 05



# ***intravitreale injectie***

### ***Wat is een intravitreale injectie?***

Dit is een inspuiting in het vitreum (glasvocht) van het oog.

Een geringe hoeveelheid medicatie (0,05cc tot max. 0,1cc) wordt in het oog ingespoten. Afhankelijk van de aandoening bestaat de inspuiting uit:

- anti-VEGF of vaatgroeiremmers
- ontstekingsremmers of corticosteroiden
- proteolytische enzymen (ocriplasmine)

Intravitreale injecties worden vooral toegepast bij:

- de natte vorm van leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD)
- macula oedeem bij diabetische retinopathie en sommige bloedvatocclusies
- vitreomaculaire adhesies

Het gaat dikwijls om een langdurige behandeling aangezien de injecties meerdere keren moeten gegeven worden met een tussenperiode van 4 tot 6 weken.

Meestal wordt er gestart met een reeks van 3 injecties, telkens met 1 maand tussen, waarna het resultaat wordt geëvalueerd.

### ***Hoe gebeurt de injectie?***

De injectie wordt gegeven onder steriele omstandigheden:

- Het oog wordt vooraf met oogdruppels verdoofd.
- Het oog en de oogleden worden ontsmet en een operatiedoek komt over het gelaat.
- De injectie wordt toegediend in het oog via de zijwand van het oog. Vaak ziet u dan een wolkje of belletjes.
- Nadien wordt oogzalf aangebracht en wordt het oog afgedekt met een oogverband.

### ***Verzorging na de ingreep***

Het oogverband mag de avond van de ingreep verwijderd worden.

Soms is uitwendig op het oog een kleine oppervlakkige bloeding te zien, deze zal spontaan verdwijnen.

Breng uw oogarts onmiddellijk op de hoogte als u 1 of 2 dagen na de ingreep bijkomende klachten heeft zoals:

- oogpijn
- toenemende roodheid van het oog
- toenemende gezichtsvermindering
- toenemende lichtschuwheid

### ***Risico's van een intravitreale injectie***

Uw arts neemt alle maatregelen om de risico's minimaal te houden.

Ernstige complicaties kunnen zijn:

- infectie binnen het oog
- netvliesloslating
- lensschade

Deze zijn echter zeldzaam.

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

- bloeding
- oogdrukstijging
- reactie op de medicatie