

Resultaat

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd.

Tot slot

Indien u verhinderd zou zijn op de dag van uw afspraak, gelieve ons dan zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00u en 17.00u:
052 25 25 05.



Urodynamisch onderzoek

informatiefiche

Afspraak op

(datum)

(uur)

Geachte mevrouw, mijnheer

Uw arts heeft voor u een urodynamisch onderzoek aangevraagd. Hiermee kan de mogelijk oorzaak van plasklachten worden opgespoord.

Bij dit onderzoek wordt namelijk de werking van de blaas, de sluitspier en het plasmechanisme getest.

Vorbereiding thuis

Het onderzoek vraagt geen bijzondere voorbereiding. U hoeft niet nuchter te zijn.

Aanmelden

U schrijft zich in aan het onthaal (1^{ste} verdieping).

Verloop van het onderzoek

- Er wordt u eerst gevraagd om de blaas zo goed mogelijk leeg te plassen.
- Na het verwijderen van de onderkleding, mag u plaats nemen op de onderzoekstafel (in rugligging met de benen in de beensteunen – zoals bij de gynaecoloog).
- Na het ontsmetten van de penis of de vagina worden de verschillende sondes geplaatst:
 - een 1^{ste} sonde wordt via de plasbuis in de blaas geplaatst
 - een 2^{de} sonde wordt geplaatst:
 - bij mannen via de aars, in het laatste deel van de endeldarm,
 - bij vrouwen vaginaal
 - De sondes wordt aan de binnenzijde van het bovenbeen vastgekleefd om te voorkomen dat ze tijdens het onderzoek loskomen.

-Rond de aars worden soms nog twee elektroden-klevers geplaatst om de activiteit van de bekkenbodemspieren te meten.
- U neemt daarna voorzichtig plaats op de toiletstoel waar de eigenlijke meting begint.
- De blaas wordt traag gevuld met steriel water. U zal moeten aangeven wanneer u een eerste plasdrang heeft. U zal tijdens het onderzoek ook enkele malen moeten hoesten of persen.

- De blaas wordt verder gevuld tot u een sterke plasdrang heeft of tot u uw plas niet meer kunt ophouden. Daarna wordt het vullen gestopt en kan u de blaas leegplassen.
- Hierna worden de sondes en elektroden verwijderd en is het onderzoek afgelopen.
- Soms wordt aansluitend nog met een camera in de blaas gekeken.

Na het onderzoek mag u naar huis; u kan en mag zelf de auto besturen.

Nazorg

-In bepaalde gevallen zal de arts u een ontsmettend middel voorschrijven.

-Het is mogelijk dat u de dag van het onderzoek (soms ook nog de dag erna) wat moeilijker of pijnlijker plast en vaker plasdrang heeft.

-Soms kan u na het onderzoek wat urinair bloedverlies hebben. Dit is niet verontrustend en zal spontaan verbeteren.

Indien deze klachten aanhouden of als u koorts krijgt, raadpleeg dan uw huisarts of de huisarts van wacht. Hij/zij zal u indien nodig doorverwijzen.